

# 精彩生活 遠離K毒



## 問與答

### 為何濫用氯胺酮(K仔)會導致膀胱收縮？

尿液中含有高濃度的氯胺酮，毒素直接損傷膀胱壁，引發間質性膀胱發炎，造成間質纖維化，膀胱失去彈性，導致膀胱容量減少。尿道未能及時完全將尿液排出，逆流回輸尿管，輸尿管被尿擴張變粗，逆流回腎臟，造成腎積水。

### 濫用氯胺酮期間，胃部或下腹部不適？

濫藥早期，有機會因膀胱收縮、痙攣，導致腸痛、胃痛及下腹痛。當膀胱功能受損，腎積水、腎脹大，增加對腎包膜壓力，引致可能會感覺胃痛或膽痛。當腎積水嚴重時，出現噁心或嘔吐、食慾下降和腹痛等不適；腎衰竭導致身體毒素未能排出體外，胃部會充血、出血及穿孔。

### 濫用氯胺酮個案引致膀胱受損時，會否影響生育能力？

男性射精及排尿都是同一管道，所以膀胱切除手術是有機會影響相關(性能力)的神經，術後會影響生育功能及陰莖勃起功能障礙。

女性尿道相對短、膀胱、子宮及直腸緊靠，若果經常出現膀胱炎，有機會誘發盤腔炎，可導致不育及增加宮外孕風險。

資料由澳門泌尿學科學會提供

### 濫用藥物 認清後果

按經第 10/2016 號法律及第 4/2014 號法律修改的第 17/2009 號法律《禁止不法生產、販賣和吸食麻醉藥品及精神藥物》，凡製造、運載、出售、持有或使用毒品均屬違法。

第 17/2009 號法律	最高刑罰
販毒	15 年
請人吸食	15 年
自己吸食或持有吸毒器具	1 年
慘害他人吸毒	3 年
同意在其所管轄的公眾場所非法使用毒品	8 年

### 諮詢熱線

社會工作局禁毒諮詢熱線 2878 1791

戒毒諮詢熱線 2835 8844

登入澳門禁毒網網頁

[www.antidrugs.gov.mo](http://www.antidrugs.gov.mo) 或

[www.ias.gov.mo](http://www.ias.gov.mo) 瀏覽相關資訊



IAS/C-PAN-09/DPP-09.2014-5,000exs

(註：部份圖片來自聯合國毒罪辦公室或網上)

## 氯胺酮



氯胺酮 (Ketamine)，是一種導入麻醉藥，特性是效果來得快而短暫。俗稱K仔、葷。常以針劑和粉狀出現。K仔是現時青少年最常濫用的毒品之一。



## 氯胺酮(K仔)的危害

氯胺酮的主要成份為「氯胺酮鹽酸鹽」，濫用後能令人產生分離性幻覺及視像扭曲，對時間、感官及身份產生錯誤的認知，並會引致腦部永久損害。



### 對呼吸系統的影響：

- ▶ 鼻黏膜長期受氯胺酮刺激，引致鼻塞、流鼻水、呼吸困難，嚴重發炎則可引致鼻中隔穿洞。



### 對腎臟及膀胱的影響：

- ▶ 尿頻、尿急、小便赤痛。



- ▶ 膀胱容量減少、腎臟嚴重受損，可導致腎衰竭。



### 對各類機能的影響：

- ▶ 口齒不清
- ▶ 長期記憶力衰退及認知能力受損
- ▶ 舉止失常，判斷力失準
- ▶ 行動機能受損
- ▶ 動作協調神經系統受損
- ▶ 呼吸 / 心臟機能受損
- ▶ 生理及心理依賴

