青少年監藥嚴重程度研究

- 澳門監測青少年藥物濫用趨勢最新發展



主辦單位:

澳門特別行政區政府禁毒委員會

合辦單位:







研究顧問:



香港遊樂場協會 温立文先生 Hong Kong Playground Association

目錄

	研究摘要	P.3
(-)	研究目的	P.4
(=)	研究方法及對象	P.4
(三)	研究結果	
	受訪者基本資料及中檔資料	P.5
	● 性別	
	● 年齢	
	受訪者中央登記表資料	P.8
	● 出生地	
	● 種族	
	● 居民身份	
	● 本地居住區分	
	● 婚姻狀況	
	● 有否子女	
	● 教育程度	
	● 職業狀況	
	● 家人有否吸毒	
	● 犯罪紀錄	
	● 首次吸毒的年齡	
	● 受訪者年齡與性別	
	藥物濫用篩選量表(Drug Abuse Screening Test)	P.15
	● 原量表的信度及效度	
	● DAST-20 量表中文化後的信度和效度	
	澳門青少年濫用藥物嚴重程度	P.17
	● 2013 年澳門青少年藥物濫用篩選量表分數及危機級別	
	● 2013年21歲以下澳門青少年量表分數及危機級別	
	分析與比較	P.22
	● 藥物濫用危機級別 按年齡比較	
	● 藥物濫用危機級別 與 居住區	
	● 藥物濫用危機級別 與 首次吸毒的年龄	
	● DAST20 分數 與首次吸毒年齡的關係	
	● 藥物濫用危機級別 與 教育程度	
	查詢及 參考資料	P.27
附件	牛一 : DAST20 量表(中文版)_	P.29

圖表一覽

表 1: 填報單位

表 2: 被訪者性別分佈

表 3: 被訪者年齡分佈

表 4: 被訪者出生地分佈

表 5: 被訪者種族分佈

表 6: 被訪者居民身份分佈

表 7: 被訪者居住區分分佈

表 8: 被訪者婚姻狀況分佈

表 9: 被訪者子女狀況分佈

表 10:被訪者教育程度

表 11:被訪者職業狀況

表 12:被訪者家人有否吸毒

表 13:被訪者犯罪紀錄

表 14:被訪者首次吸毒年齡

表 15:年齡與性別交互表列分析

表 16: 有關 DAST20 的信度研究

表 17:藥物濫用危機級別分級表

表 18:2013 年澳門青少年 DAST-20 分數

表 19: DAST-20 分數分佈

表 20: 按年齡分組 DAST-20 分數

表 21:2013 年受訪者藥物濫用危機級別

表 22:按年齡分組的藥物濫用危機級別

表 23:受訪者濫用藥物危機級別與年齡的關係

表 24:濫用藥物危機級別與年齡分佈

表 25:藥物濫用危機級別 與 居住區

表 26:交互列表分析首次吸毒的年龄 與 藥物濫用危機級別

表 27: DAST-20 分數與首次吸毒的年齡

表 28:DAST-20 分數與首次吸毒的年齡的皮爾森相關係數

表 29:教育程度 與 藥物濫用危機級別

圖 1:被訪者性別分佈圖

圖 2:被訪者年齡直方圖

圖 3: DAST-20 量表分數直方圖

圖 4:藥物濫用危機級別

圖 5:濫用藥物危機級別分佈圖(21歲以下)

圖 6:濫用藥物危機級別分佈圖(21 歲或以上)

摘要

本研究於 2013 年度訪問了 83 位澳門有濫用藥物危機的青少年,以中文版藥物濫用篩選量表 DAST-20 為測量工具,再配合其澳門濫用藥物者中央登記表的資料進行統計分析,以測量監察青少年濫用藥物嚴重程度的趨勢及變化。

目的:測量監察澳門青少年濫用藥物嚴重程度的趨勢及變化

資料: 澳門 83 位有濫用藥物危機的青少年

數據及結論:

- 1. 澳門受訪青少年其 DAST20 的平均分數為 9.65, 藥物濫用危機級別為「中度」。(p.17)
- 2. 21 歲以下 DAST-20 的平均分數為 8.85, 21 歲或以上 DAST-20 的平均分數為 10.18。 (p.17)
- 3. 受訪者的危機級別按與年齡出現顯著(P<0.05)正關係 r=0.233,藥物濫用危機級別隨年齡增長而增加。(p.22)
- 4. 受訪的藥物濫用青少年主要居住於澳門北區。(p.28)
- 5. 大部份受訪者開始吸毒的年齡為 13 至 16 歲,超過一半受訪者(52%)於 15 歲前首次 吸毒。(p.23)

澳門青少年濫藥深度研究

澳門特別行政區政府於 2009 建立藥物濫用者中央登記系統,監察社會整體吸毒情況。特區禁毒委員會轄下關注青少年毒品問題工作小組為了進一步掌握澳門青少年濫用藥物的情況,於 2010 年開始進行研究,以強化社區青少年濫用藥物的監察及服務跟進。 經徵詢聯合國世界衛生組織意見並進行文獻回顧及資料整理後,最終選取了藥物濫用篩選量表 DAST-20 作為濫藥深度研究的評估工具,並且每年收集有關數據以評估澳門青少年濫用藥物的最新情況。

(一) 研究目的

- 1.1 探索澳門青少年濫用藥物的現況
- 1.2 對 DAST-20 量表進行中文化,並測試中文化後的信度。
- 1.3 以國際化量表,定期監察責少年濫用藥物嚴重程度的趨勢及變化。

(二) 研究方法及對象

本研究由 2013 年 1 至 12 月期間共訪問 83 位接受戒毒復康處、街坊會聯合總會、 聖公會及新生命團契服務有濫用藥物危機的青少年,填寫中文版 DAST-20 問卷,再配合 其澳門濫用藥物者中央登記表的資料進行統計分析。

表 1: 填報單位

填報單位	次數	百分比	有效百分比	累積百分比
戒毒復康處	48	57.8	57.8	57.8
聖公會	3	3.6	3.6	61.4
新生命團契	29	34.9	34.9	96.4
街坊會聯合總會	3	3.6	3.6	100.0
總和	83	100.0	100.0	

(三) 研究結果

受訪者基本資料


性別

是次受訪者以男性共 66 人佔 79.5%, 女性共 17 人佔 20.5%。

表 2: 被訪者性別分佈

被訪者性別	次數	百分比	有效百分比	累積百分比
女性	17	20.5	20.5	20.5
男性	66	79.5	79.5	100.0
總和	83	100.0	100.0	

圖 1:被訪者性別分佈圖




年齡

受訪者年齡由12歲至30歲,平均年齡為21.13歲;標準差為4.099。由於本年度填報單位包括戒毒復康處及民間機構,受訪者年齡分佈範圍較廣泛。21歲以下的受訪者共34人, 21歲或以上的受訪者共49人。

表 3: 被訪者年齡分佈

年齡	人數	百分比	有效百分比	累積百分比
12	1	1.2	1.2	1.2
14	3	3.6	3.6	4.8
15	5	6.0	6.0	10.8
16	4	4.8	4.8	15.7
17	6	7.2	7.2	22.9
18	5	6.0	6.0	28.9
19	5	6.0	6.0	34.9
20	5	6.0	6.0	41.0
21	9	10.8	10.8	51.8
22	7	8.4	8.4	60.2
23	5	6.0	6.0	66.3
24	12	14.5	14.5	80.7
25	4	4.8	4.8	85.5
26	5	6.0	6.0	91.6
27	2	2.4	2.4	94.0
28	3	3.6	3.6	97.6
30	2	2.4	2.4	100.0
終計	83	100.0	100.0	

圖 2:被訪者年齡直方圖



受訪者中央登記表資料

出生地

受訪者主要出生地為澳門,有效百分比佔89%。

表 4: 被訪者出生地分佈

出生地	次數	百分比	有效百分比	累積百分比
中國內地	9	10.8	11.1	11.1
澳門	72	86.7	88.9	100.0
香港	0	0	0	100.0
其他	0	0	0	100.0
總和	81	97.6	100.0	
遺漏值	2	2.4	_	
總和	83	100.0	-	

種族

受訪者77人是華人,有效百分比為98.7%。

表 5: 被訪者種族分佈

Ŕ	種族	次數	百分比	有效百分比	累積百分比
	華人	77	92.8	98.7	98.7
	其他	1	1.2	1.3	100.0
	總和	78	94.0	100.0	
	遺漏值	5	6.0		
總和		83	100.0		

居民身份

70名受訪者居民身份是澳門居民,有效百分比為98.6%。

表 6: 被訪者居民身份分佈

居民身份	次數	百分比	有效百分比	累積百分比
澳門居民	70	84.3	98.6	98.6
非澳門居民	1	1.2	1.4	100.0
總和	71	85.5	100.0	
遺漏值	12	14.3		
總和	83	100.0	-	

本地居住區分

受訪者居住區分大部分於北區,佔有效百分比72.2%。

表 7: 被訪者居住區分分佈

本地居住區分	次數	百分比	有效百分比	累積百分比
北區	52	62.7	72.2	72.2
中區	14	16.9	19.4	91.7
南區	3	3.6	4.2	95.8
路氹	2	2.4	2.8	98.6
中國內地	1	1.2	1.4	100.0
總和	72	86.7	100.0	
遺漏值	11	13.3	_	
總和	83	100.0		

婚姻狀況

受訪者婚姻狀況大部分為未婚,佔有效百分比86.4%。已婚佔有效百分比10%。

表 8: 被訪者婚姻狀況分佈

婚姻狀況	ť	次數	百分比	有效百分比	累積百分比
	未婚	69	83.1	86.4	86.3
	已婚	8	9.6	10.0	96.3
	同居	0	0	0	96.3
	離婚或分居	2	2.4	2.5	98.8
	不詳	1	1.2	1.3	100.0
	總和	80	96.4	100.0	
遺漏值		3	3.6	_	
總和		83	100.0		

有否子女

受訪者大部分沒有子女,佔有效百分比87.7%。

表 9: 被訪者子女狀況分佈

有否子	女	次數	百分比	有效百分比	累積百分比
	 有	8	9.6	9.9	9.9
	無	71	85.5	87.7	97.5
	不詳	2	2.4	2.5	100.0
	總和	81	97.6	100.0	
	遺漏值	2	2.4		
總和		83	100.0	-	

教育程度

受訪者的教育程度大部分集中於小學及初中,合共有效百分比為82.3%。

表 10: 被訪者教育程度

茅		次數	百分比	有效百分比	累積百分比
	無	2	2.4	2.5	2.5
	小學	23	27.7	29.1	31.6
	初中	42	50.6	53.2	84.8
	高中	8	9.6	10.1	94.9
	大專或以上	1	1.2	1.3	96.2
	不詳	3	3.6	3.8	100.0
	總和	79	95.2	100.0	
	遺漏值	4	4.8	_	
總和		83	100.0		

職業狀況

受訪者的職業狀況首三位為全職、無業及學生,分別佔有效百分比 48.1%,21.5%及 17.7%。

表 11: 被訪者職業狀況

職業狀況

		'	194214712470		
		次數	百分比	有效百分比	累積百分比
	全職	38	45.8	48.1	48.1
	散工	8	9.6	10.1	58.2
	非法行業	1	1.2	1.3	59.5
	無業	17	20.5	21.5	81.0
	學生	14	16.9	17.7	98.7
	家務	0	0	0	98.7
	不詳	1	1.2	1.3	100.0
	總和	79	95.2	100.0	
	遺漏值	4	4.8	_	
總和		83	100.0		

家人有否吸毒

受訪者家人有吸毒的佔有效百分比 17.3%, 77.8%表示其家人沒有吸毒。

表 12: 被訪者家人有否吸毒

家人有	否吸毒	次數	百分比	有效百分比	累積百分比
	有	14	16.9	17.3	17.3
	無	63	75.9	77.8	95.1
	不詳	4	4.8	4.9	100.0
	總和	81	97.6	100.0	
	遺漏值	2	2.4		
總和		83	100.0		

犯罪紀錄

受訪者有犯罪紀錄的佔有效百分比 64.9%, 26%表示沒有犯罪紀錄。

表 13: 被訪者犯罪紀錄

有無犯	卫罪紀錄	次數	百分比	有效百分比	累積百分比
	有	50	60.2	64.9	64.9
	無	20	24.1	26.0	90.9
	不詳	7	8.4	9.1	100.0
	總和	77	92.8	100.0	
	遺漏值	6	7.2		
總和		83	100.0		

首次吸毒的年齡

是次83位受訪者,其首次吸毒的年齡由9歲至24歲,平均首次吸毒年齡為 16.41歲。

表 14:被訪者首次吸毒年齡

	-	個數	最小值	最大值	平均數	標準差
首次吸毒的	万年齡	83	9	24	16.41	3.015
有效人數		79				
首次吸毒的	1年齢	次	數 百分	分比 有效	女百分比	累積百分比
<u>-</u>	9	1	1	.2	1.3	1.3
	10	1	1	.2	1.3	2.5
	11	1	1	.2	1.3	3.8
	13	8		.6	10.1	13.9
	14	9	10	0.8	11.4	25.3
	15	15	5 18		19.0	44.3
	16	11	1 13	3.3	13.9	58.2
	17	9			11.4	69.6
	18	5		.0	6.3	75.9
	19	8		.6	10.1	86.1
	20	2		.4	2.5	88.6
	21	2		.4	2.5	91.1
	22	4		.8	5.1	96.2
	23	2	2	.4	2.5	98.7
	24	1	1	.2	1.3	100.0
	總和	79	9 9	5.2	0.001	
	遺漏值	4	4	.8		
總和		83	3 10	0.0		

受訪者年齡與性別

以受訪者年齡與性別進行交互表列分析,女性被訪者年齡由(12至28歲)而男性被訪者年齡為 (14至30歲)。女性受訪者年齡較男性低。

表 15: 年齡與性別交互表列分析

年齡_	被訪者性別		總和
	女性	男性	
12	1	0	1
14	2	1	3
15	5	0	5
16	0	4	4
17	1	5	6
18	2	3	5
19	2	3	5
20	1	4	5
21	1	8	9
22	0	7	7
23	1	4	5
24	0	12	12
25	0	4	4
26	0	5	5
27	0	2	2
28	1	2	3
30	0	2	2
總和	17	66	83

藥物濫用篩選量表(Drug Abuse Screening Test)

藥物濫用篩選量表DAST是一個單維尺度量表(uni-dimensional scale),分數越高其藥物濫用問題越嚴重。由於量表具有優良的信度和效度並且使用方便,DAST量表多年來廣泛為世界各國防治藥物濫用機構使用。藥物濫用篩選量表DAST有多個版本,分別有28題、20題及10題。是次研究選取DAST-20為測量工具。

原量表的信度及效度

研發藥物濫用篩選量表的斯金納教授表示,DAST-20 量表的可靠性十分之高,DAST-20 題版本與 DAST-28 題版本的相關度達到 r=0.99。 至於 DAST-20 的整體樣本內在一致性信度(internal consistency reliability)十分高,其克隆巴赫係數(Cronbach's Alpha)達到 0.95,剔除濫用酒精類的子樣本後,克隆巴赫係數為 0.86。DAST-20 量表能有效地區分填表者藥物濫用的情況,以便提供服務和支援。 (Skinner, Guide for the using the Drug Abuse Screening Test(DAST), 1982)

此外,回顧美國醫學圖書館的資料庫 Medline 及 Psychinfo 由 1982 至 2005 年的研究資料,過去亦有多次研究驗證 DAST-20 的信度。DAST-20 量表的克隆巴赫係數分別由 0.74×0.92 不等。 (Yudko, E., Lozhkina, O., & Fouts, A., 2007)

表 16: 有關 DAST20 的信度研究

版本	研究	樣本	克隆巴赫
			係數
DAST-20/	(Skinner, The drug abuse	223 位自願接受戒酒及戒毒	0.92
DAST-28	screening test, 1982)	服務人士	0.95
DAST-20	(Salstone, R., Halliwell, S., &	318 位女性罪犯	0.88
	Hayslip, M. A., 1994)		
DAST-20	(Skinner, H. A., & Goldberg, A.	105 位精神科藥物使用者	0.74
	E., 1986)		
DAST-10/	(Cocco, K. M., & Carey, K. B.,	97位精神科門診病人	0.92
DAST-20	1998)		0.86

(Yudko, E., Lozhkina, O., & Fouts, A., 2007)

DAST-20 量表中文化後的信度和效度

是次DAST-20量表中文化,由澳門社工局防治藥物依賴廳聯同澳門街坊會聯合總會社區 青年工作隊、聖公會北區青年服務隊及新生命團契等民間機構的外展社工共同進行,有 關團體為澳門主要為高危青少年提供輔導的機構,對輔導有濫用藥物危機的青少年均有 豐富前線實務經驗。(澳門政府社會工作局,香港城市大學,2005)

中文版DAST-20量表初稿完成後,由包括香港及澳門的多名資深邊青服務社工評估其表面效度(face validity)並同意有關翻譯能準確反映原量表的意思。初版DAST-20量表交社工局及以上各團體確認後,由前線社工在社區中邀請青少年試做並收集意見進行調整,其後再交由母語為英語並能閱讀中文的獨立人士進行回譯,確保與原量表的一致性,最後定稿將量表送交DAST-20作者斯金納教授評閱並交由上述各團體使用。

一個可靠的測量工具應具有高的信度,即每次使用量表時都會產生相似的結果。是次研究以克隆巴赫係數(Cronbach's alpha)分析 DAST-20的信度。(Cronbach, 1951)當克隆巴赫係數達到 0.7以上其信度為可接受,0.8以上為良好信度,0.9以上為優良信度。(George, D., & Mallery, P., 2008)

經過至2010至2013三年共278有效個案的測試中,DAST-20量表中文化的克隆巴赫係數仍保持在0.82的高水平,與原版的0.86極為接近,說明中文化後並無損原量表。DAST-20中文版量表處高信度水平,能有效評估澳門青少年濫藥的情況。

澳門青少年濫用藥物嚴重程度

禁委會轄下「關注青少年毒品問題工作小組」有關成員機構,以有關中文版DAST-20 量表訪問有濫用藥物危機的青少年,以評估青少年藥物濫用的危機級別,並持續監測澳 門青少年濫藥的嚴重情況和發展趨勢。

DAST-20量表的計分方法如下,20條有關藥物濫用的問題中,如回答「是」則有1分、最低為0分(第4及5題為反向題,答「是」為0分,答「否」為1分),量表最高為20分 (Skinner, The drug abuse screening test, 1982)。

藥物濫用危機級別

按DAST-20量表使用指引,受訪人士可按其量表分數評估其藥物濫用危機級別,分別由沒有危機至非常嚴重5級,並建議不同危機級別的相應行動,以助評估及作出跟進。

表 17 :藥物濫用危機級別分級表

藥物濫用危機級別	DAST-20 分數	建議相應行動	ASAM 標準
没有	0	繼續監控	
低度	1-5	輔導跟進	Level I
中度	6 – 10	門診(密集式)	Level I or II
深度	11 – 15	密集式治療跟進	Level II or III
非常嚴重	16 – 20	密集式治療跟進	Level III or IV

ASAM: 美國成癮藥物協會-成癮病人安置標準(Mee-Lee, D., & American Society of Addiction Medicine., 2001)

2013年澳門青少年藥物濫用篩選量表分數(DAST-20分數)及危機級別

在本項研究中,83位受訪者其DAST-20的平均分數為9.65,藥物濫用危機為「中度」。按 美國成癮藥物協會-成癮病人安置標準,應接受濫用藥物門診等服務。如按年齡分組, 21歲以下DAST-20的平均分數為8.62, 21歲或以上DAST-20的平均分數為10.37。

表 18:2013年澳門青少年DAST-20分數

/田事/-	有效的	83
個數	遺漏值	0
7	P均數	9.65
村	3.83	
最小值		1
	是大值	18

2012年度有關青少年DAST-20分數分佈詳列如下:

表 19: DAST-20分數分佈

DAST-20分數	人數	百分比	有效百分比	累積百分比
1	2	2.4	2.4	2.4
2	1	1.2	1.2	3.6
3	1	1.2	1.2	4.8
4	4	4.8	4.8	9.6
5	4	4.8	4.8	14.5
6	2	2.4	2.4	16.9
7	13	15.7	15.7	32.5
8	4	4.8	4.8	37.3
9	11	13.3	13.3	50.6
10	8	9.6	9.6	60.2
11	7	8.4	8.4	68.7
12	4	4.8	4.8	73.5
13	9	10.8	10.8	84.3
14	2	2.4	2.4	86.7
15	5	6.0	6.0	92.8
16	4	4.8	4.8	97.6
17	1	1.2	1.2	98.8
18	1	1.2	1.2	100.0
總和	83	100.0	100.0	

圖 3: DAST-20 量表分數直方圖




表 20:按年齡分組DAST-20分數

	年齡組別	個數	最小值	最大值	平均數	標準差
DAST-20	21歲以下	34	1	16	8.61	4.163
的分數	21歲或以上	49	4	18	10.37	3.444


澳門青少年藥物濫用危機級別

是次研究的受訪者藥物濫用危機級別以「中度」及「深度」為主,分別佔45.8%及32.5%。同時亦有7.2%的受訪者其藥物濫用危機級別為「非常嚴重」

表 21:2013年受訪者藥物濫用危機級別

藥物濫用危機級別	人數	百分比	有效百分比	累積百分比
● 沒有	0	0	0	0
● 低度	12	14.5	14.5	14.5
● 中度	38	45.8	45.8	60.2
● 深度	27	32.5	32.5	92.8
● 非常嚴重	6	7.2	7.2	100.0
總和	83	100.0	100.0	

圖 4:藥物濫用危機級別



如按年齡分組,21歲以下藥物濫用危機級別以「中度」佔多數,有50%。而 21歲或以上藥物濫用危機級別以「中度」及「深度」佔多,分別有42.9%及40.8%。

表 22:按年齡分組的藥物濫用危機級別分佈圖

年齒	∜分組	次數	百分比	有效百分比	累積百分比
	沒有	0	0	0	0
	低度	8	23.5	23.5	23.5
21歲以下	中度	17	50.0	50.0	73.5
	深度	7	20.6	20.6	94.1
	非常嚴重	2	5.9	5.9	100.0
	總和	34	100.0	100.0	
	低度	0	0	0	0
	低度	4	8.2	8.2	8.2
21 歲或以上	中度	21	42.9	42.9	51.0
21 厥蚁以上	深度	20	40.8	40.8	91.8
	非常嚴重	4	8.2	8.2	100.0
	總和	49	100.0	100.0	

圖 5:藥物濫用危機級別分佈圖(21歲以下)

藥物濫用危機







圖 6:藥物濫用危機級別分佈圖(21歲或以上)

藥物濫用危機



分析與比較

藥物濫用危機級別按年齡比較

有關藥物濫用危機級別按年齡比較,是次樣本出現顯著(P<0.05)正關係 r=0.346,藥物濫用危機級別隨年齡增長而增加。

表 23: 受訪者藥物濫用危機級別與年齡關係

		年齡	藥物濫用危機
	Pearson 相關	1	.346**
年齡	顯著性 (雙尾)		.001
	個數	83	83
	Pearson 相關	.346**	1
藥物濫用危機	顯著性 (雙尾)	.001	
	個數	83	83

^{**.} 在顯著水準為0.01時 (雙尾),相關顯著。

表 24:藥物濫用危機級別及年齡分佈

左 紫丛	藥物濫用危機級別					
年齡	沒有	低度	中度	深度	非常嚴重	總和
12	0	0	1	0	0	1
14	0	2	1	0	0	3
15	0	1	2	1	1	5
16	0	2	2	0	0	4
17	0	2	3	1	0	6
18	0	0	3	1	1	5
19	0	0	4	1	0	5
20	0	1	1	3	0	5
21	0	1	3	4	1	9
22	0	0	6	1	0	7
23	0	0	2	3	0	5
24	0	2	5	5	0	12
25	0	0	2	2	0	4
26	0	1	2	2	0	5
27	0	0	0	1	1	2
28	0	0	1	1	1	3
30	0	0	0	1	1	2
總和		12	38	27	6	83

濫藥深度研究 與 澳門濫用藥物者中央登記表交互表列分析

藥物濫用危機級別 與 居住區

受訪者普遍居住在北區,相對於中區及南區的受訪人數為多。濫藥程度方面也是居住在北區的受訪者程度較重。

表 25:藥物濫用危機級別 與 居住區

		藥物濫用危機			總和	
		低度	中度	深度	非常嚴重	
	北區	6	24	17	5	52
本地居住區分	中區	3	7	4	0	14
	南區	0	3	0	0	3
	路氹	0	1	1	0	2
	中國內地	1	0	0	0	1
總和		10	35	22	5	72

藥物濫用危機級別 與 首次吸毒的年齡

大部份受訪者開始吸毒的年齡為13至16歲,超過一半受訪者(52%)於15歲前首次吸毒。 表 26:交互列表分析首次吸毒的年齡 與 藥物濫用危機級別

首次吸毒的年齡		總和			
	低度	中度	深度	非常嚴重	
9	0	0	1	0	1
10	0	1	0	0	1
11	0	1	0	0	1
13	1	4	2	1	8
14	4	1	3	1	9
15	1	6	6	2	15
16	2	7	2	0	11
17	2	3	4	0	9
18	1	3	1	0	5
19	0	6	1	1	8
20	0	2	0	0	2
21	0	0	2	0	2
22	0	2	2	0	4
23	0	1	0	1	2
24	0	1	0	0	1
總和	11	38	24	6	79

DAST-20 分數與首次吸毒的年齡的關係

以受訪者首次吸毒的年齡與 DAST-20 分數進行皮爾森相關係數分析, DAST-20 平均分數為 9.65, 首次吸毒的年齡平均為 16.41 歲。由以下列表顯示(P=0.973>0.05), 因此 DAST-20 分數與首次吸毒的年齡並未出現顯著關係。

表 27: DAST-20 分數與首次吸毒的年齡

	平均數	標準差	個數
DAST20分數	9.65	3.830	83
首次吸毒的年齡	16.41	3.015	79

表 28: DAST-20分數與首次吸毒的年齡的皮爾森相關係數

77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.					
		DAST20分數	首次吸毒的年齡		
DAST20分數	Pearson 相關	1	004		
	顯著性 (雙尾)		.973		
	個數	83	79		
首次吸毒的	Pearson 相關	004	1		
年齡	顯著性 (雙尾)	.973			
	個數	79	79		

藥物濫用危機級別 與 教育程度

大部分的受訪者教育程度為小學及初中,其中只有初中程度的受訪者在任何級別均為人數佔多。

表 29:教育程度 與 藥物濫用危機級別

教育程度		藥物濫用危機級別				總和
		低度	中度	深度	非常嚴重	
	無	1	1	0	0	2
	小學	4	9	8	2	23
	初中	5	22	11	4	42
	高中	2	3	3	0	8
フ	大專或以上	0	1	0	0	1
	不詳	0	1	2	0	3
	總和	12	37	24	6	79

參考資料

Reference

- 李麗萍,溫立文 (2011). 澳門監測青少年藥物濫用趨勢最新發展, 2011 年全國藥物濫用防治研討會論文集. 香港.
- 澳門政府社會工作局 , 香港城市大學. (2005). 澳門特別行政區青年問題與服務發展藍圖研究報告書. 澳門: 澳門特別行政區政府.
- 澳門特別行政區政府. (2006). 澳門居住人口預測 2007-2031. 澳門: 統計暨普查局.
- 澳門特區政府社會工作局防治藥物依賴廳. (2010). 澳門藥物濫用者中央登記系統 2010 報告書. 澳門: 澳門特別行政區政府.
- Cocco, K. M., & Carey, K. B. (1998, January 01). Psychometric properties of the Drug Abuse Screening Test in psychiatric outpatients. *Psychological Assessment*, pp. 10, 4, 408-414.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika* 16(3), pp. 297-334.
- FuCui-xin. (2002). A Research for Reliability, Coefficient Alpha and Related Issues. 教育學刊, 頁 18, p.163~184.
- George, D., & Mallery, P. (2008). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. NJ: Recording for the Blind & Dyslexic.
- Knight, J. R., Sherritt, L., Shrier, L. A., Harris, S. K., & Chang, G. (2002, January 01). Validity of the CRAFFT substance abuse screening test among adolescent clinic patients. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, pp. 156, 6, 607-14.
- Lam, CW. Ng, HY. Boey, KW. (2002). Measuring Drug Abuse: The Development of the Chinese Drug Involvement Scale in Hong Kong. *Research on Social Work Practice, 2002, v. 12 n. 4,*, pp. p. 525-533.
- Mee-Lee, D., & American Society of Addiction Medicine. (2001). *ASAM patient placement criteria for the treatment of substance-related disorders*. American Society of Addiction Medicine.
- Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for Windows

 Maidenhead, Berkshire:. Berkshire: Open University Press.
- Salstone, R., Halliwell, S., & Hayslip, M. A. (1994). Multivariate evaluation of the Michigan Alcoholism Screening

 Test and the Drug Abuse Screening Test in a female offender population. *Addictive Behaviors*, pp.

 455-462.
- Skinner, H. A. (1982). *Guide for the using the Drug Abuse Screening Test(DAST).* Toronto: Department of Public Health Sciences, University of Toronto.
- Skinner, H. A. (1982, January 01). The drug abuse screening test. Addictive Behaviors, pp. 7, 4, 363-71.
- Skinner, H. A., & Goldberg, A. E. (1986, January 01). Evidence for a drug dependence syndrome among narcotic users. *British Journal of Addiction*, pp. 81, 4, 479-84.

Slocum, S. L. (2005). Assessing Unidimensionality of Psychological Scales: Using Criteria from Factor Analysis.

University of California Los Angeles: SEMEL INSTITUTE FOR NEUROSCIENCE AND HUMAN BEHAVIOR.

Yamane, T. (1967). Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed. New York: Harper and Row.

Yudko, E., Lozhkina, O., & Fouts, A. (2007, January 01). A comprehensive review of the psychometric properties of the Drug Abuse Screening Test. *Journal of Substance Abuse Treatment*, pp. 32, 2, 189-98.

查詢

支持單位 : 澳門特別行政區政府禁毒委員會

主辦單位 : 澳門特別行政區政府 社會工作局 防治藥物依賴廳

協辦單位 : 澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊、

聖公會北區青年服務隊、 澳門基督教新生命團契

研究顧問 : 香港遊樂場協會 溫立文

電郵 lapman@hkpa.hk 電話 (852)2573 3849

地址:香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 11 樓

報告下載 : 澳門禁毒網

http://www.antidrugs.gov.mo/anti/web/cn/research.jsp

附件一: DAST-20 量表(中文版)

過去的 12 個月內、您有沒有出現以下情況?

請圈出你的答案

1. 你有使用醫療原因以外的其他藥物?	是 / 否				
2. 你有濫用經醫生處方的藥物?	是 / 否				
3. 你在同一時間內曾濫用超過一種藥物?	是 / 否				
4. 當你想要停止濫藥的時候,你總是能夠停止?	是 / 否				
5. 你能一星期不濫用藥物?	是 / 否				
6. 即使你停止濫藥一段時間,仍然會出現眼前昏黑或產生幻覺?	是 / 否				
7. 你曾因濫藥而感到不安或懷有罪疚感?	是 / 否				
8. 你的父母或伴侶曾責備你濫用藥物?	是 / 否				
9. 你曾因濫藥而導致你與父母或伴侶出現問題?	是 / 否				
10. 你曾因濫藥而失去朋友?	是 / 否				
11. 你曾因濫藥而忽略家人?	是 / 否				
12. 你曾因濫藥而導致在工作或學校內遇到麻煩?	是 / 否				
13. 你曾因濫藥而影響學業或工作?	是 / 否				
14. 你曾因濫藥而有打鬥行為?	是 / 否				
15. 你曾為了取得藥物而從事非法活動?	是 / 否				
16. 你曾因藏毒而被捕?	是 / 否				
17. 你曾因停止濫藥而感到不適(出現戒斷症狀)?	是 / 否				
18. 你曾因濫藥而出現健康問題(例如:失憶、胃痛、尿頻、鼻炎等)?是 / 否					
19. 你曾因濫藥而向他人求助?	是 / 否				

DAST20 © Copyright 1982 by Harvey A. Skinner, PhD and the Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada. You may reproduce this instrument for non-commercial use (clinical, research, training purposes) as long as you credit the author Harvey A. Skinner, Department of Public Health Sciences, University of Toronto.

DAST20(Chinese adaptation) © Copyright 2011 by the Youth Drug Problem Concern Working Group, Narcotics Control Committee of Macao SAR government, . You may reproduce DAST20 (Chinese adaptation) for non-commercial use (clinical, research, training purposes).

20. 你曾因濫藥而接受戒毒治療?

是 / 否