

常被濫用的物質



澳門特別行政區政府
社會工作局
GOVERNO DA RAEM
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

麻醉鎮痛劑



海洛因

白粉，粉，灰，
三仔，四仔

濫用後果

成癮、昏睡、壓抑呼吸、噁心以及出現“斷癮跡象”如：流眼水、流鼻涕、打呵欠、食慾不振、煩躁、震顫、感到寒冷、出汗、痙攣等症狀。

鎮靜劑



咪達唑侖



速眠安/藍精靈



三唑侖
藍精靈/白瓜子



氟硝西洋（氟硝安定）
十字架
硝甲西洋
紅五(5仔)



氯胺酮

K仔、茄

濫用後果

說話迷糊、記憶力衰退、行動/呼吸/心臟機能受損、形成耐藥性及心理依賴。

濫用後果

成癮、昏睡、暈眩、抑鬱、動作不協調、失憶等。

**濫用藥物 認清後果
販毒最高監禁15年**

興奮劑

迷幻劑



大麻

草

濫用後果

舉止失常、判斷力失準、支氣管炎、結膜炎、內分泌紊亂。



麥角副酸
二乙基胺
(麥角二乙胺)
LSD

濫用後果

舉止失常、判斷力失準、噁心及嘔吐、心跳加速及血壓上升。

澳門禁毒網

www.antidrugs.gov.mo

禁毒諮詢熱線

TEL:28781791



亞甲二氧基甲基
安非他命
二甲(甲烯二氧)
MDMA
忘我、搖頭丸
Ecstasy

甲基安非他命

冰，去氧麻黃素

濫用後果

脫水、筋疲力盡、失眠、抑鬱、食慾不振、心臟及腎臟衰竭、中毒性精神病，出現幻覺或妄想。



甲基苯丙胺及
咖啡因
麻古

馬

濫用後果

甲基笨丙胺的濫用症狀為興奮、意識障礙、頭痛、胸痛、高血壓、大汗、瞳孔擴大、感知覺障礙、呼吸急速、抽搐、昏迷。



可卡因

可可精

濫用後果

激動不安、被迫害感覺、幻覺、幻聽、感覺扭曲、情緒波動、影響記憶力、破壞鼻腔組織、性無能、精神錯亂及心臟衰竭導致死亡。

其他



可待因

止咳水

濫用後果

成癮，壓抑呼吸、便秘、食慾不振、暈眩和中毒性精神病等。



煙草

煙、煙仔、雪茄

濫用後果

長期服用會導致成癮及肺部受損，提高肺癌、慢性氣管炎、肺氣腫及心臟病和令中風的可能性增加。



酒精

含酒精類飲品如：
啤酒、香檳、葡萄酒
、白蘭地、威士忌等

濫用後果

酒精過量會令人反應緩慢、四肢動作不協調、判斷力失準，甚至昏迷。長期濫用會導致成癥，令肝臟、腦部及心臟機能受損。